

# 高级算法设计与分析

## 计数问题

夏盟佶  
Xia, Mingji

中科院软件所  
计算机科学国家重点实验室

2016.6

## #P

- $F : \Sigma^* \rightarrow \mathbf{N}$  (e.g.  $\Sigma = \{0, 1\}$ )

## 例

完美匹配数目问题 ( $\#PerfectMatching$ )

输入：图  $G$  (的编码)

输出： $G$  的完美匹配数目

## #P

- $F : \Sigma^* \rightarrow \mathbf{N}$  (e.g.  $\Sigma = \{0, 1\}$ )

## 例

完美匹配数目问题 ( $\#PerfectMatching$ )

输入：图  $G$  (的编码)

输出： $G$  的完美匹配数目

## • 定义

$$F \in \#P$$

当且仅当存在多项式时间不确定型图灵机  $M$ ，使得  $M(x)$  的接受计算路径数目等于  $F(x)$ ，

当且仅当存在多项式时间算法  $R$ ， $R$  的两个输入  $x$  和  $y$  总满足  $|y| = |x|^k$ ，使得  $F(x) = |\{y|R(x, y) = 1\}|$ 。

## #P

- $F : \Sigma^* \rightarrow \mathbf{N}$  (e.g.  $\Sigma = \{0, 1\}$ )

## 例

完美匹配数目问题 ( $\#PerfectMatching$ )

输入：图  $G$  (的编码)

输出： $G$  的完美匹配数目

## • 定义

$F \in \#P$

当且仅当存在多项式时间不确定型图灵机  $M$ ，使得  $M(x)$  的接受计算路径数目等于  $F(x)$ ，

当且仅当存在多项式时间算法  $R$ ， $R$  的两个输入  $x$  和  $y$  总满足  $|y| = |x|^k$ ，使得  $F(x) = |\{y|R(x, y) = 1\}|$ 。

- NP 里的判定问题问有没有证据  $y$ ，#P 里的计数问题问有多少证据。

## #P

- $F : \Sigma^* \rightarrow \mathbf{N}$  (e.g.  $\Sigma = \{0, 1\}$ )

## 例

完美匹配数目问题 ( $\#PerfectMatching$ )

输入：图  $G$  (的编码)

输出： $G$  的完美匹配数目

## • 定义

$F \in \#P$

当且仅当存在多项式时间不确定型图灵机  $M$ ，使得  $M(x)$  的接受计算路径数目等于  $F(x)$ ，

当且仅当存在多项式时间算法  $R$ ， $R$  的两个输入  $x$  和  $y$  总满足  $|y| = |x|^k$ ，使得  $F(x) = |\{y|R(x, y) = 1\}|$ 。

- NP 里的判定问题问有没有证据  $y$ ，#P 里的计数问题问有多少证据。
- 这个类由 L. Valiant 于 1979 年在文章 “The complexity of computing the permanent”，Theoretical Computer Science，中首次提出。

# #P 难

# #P难

- 定义

#P难问题：

如果#P里的所有问题都可以多项式时间图灵归约到F，那么F就是#P难问题。

# #P难

- 定义

#P难问题：

如果#P里的所有问题都可以多项式时间图灵归约到F，那么F就是#P难问题。

- 如果一个问题是由#P难的，那么也是NP难的。

# #P难

- 定义

#P难问题：

如果#P里的所有问题都可以多项式时间图灵归约到F，那么F就是#P难问题。

- 如果一个问题 是#P难的，那么也是NP难的。
- 一个二元函数R定义的计数问题是否是#P难的，和同一个R定义的判定问题是否是NP难的，这两种命题没有关系。

# #P难

- 定义

#P难问题：

如果#P里的所有问题都可以多项式时间图灵归约到F，那么F就是#P难问题。

- 如果一个问题 是#P难的，那么也是NP难的。
- 一个二元函数R定义的计数问题是否是#P难的，和同一个R定义的判定问题是否是NP难的，这两种命题没有关系。
- Toda定理：

$$PH \subseteq P^{\#P}.$$

# #P难问题

- #SAT, Permanent, 哈密尔顿回路数目问题, .....

# #P难题

- #SAT, Permanent, 哈密尔顿回路数目问题, .....

## Theorem

#SAT是#P难的。

# #P难问题

- #SAT, Permanent, 哈密尔顿回路数目问题, .....

## Theorem

#SAT是#P难的。

- 证明类似Cook定理。

# #P难问题

- #SAT, Permanent, 哈密尔顿回路数目问题, .....

## Theorem

#SAT是#P难的。

- 证明类似Cook定理。

## Theorem

0,1-Permanent是#P难的。

# #P难问题

- #SAT, Permanent, 哈密尔顿回路数目问题, .....

## Theorem

#SAT是#P难的。

- 证明类似Cook定理。

## Theorem

0,1-Permanent是#P难的。

- 因为#SAT可以归约到Permanent，并且归约有传递性。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

- $A$ 有两种图表示:  $n$ 个点的有向图, 和 $2n$ 个点的偶图。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

- $A$ 有两种图表示:  $n$ 个点的有向图, 和 $2n$ 个点的偶图。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}$   
有向图 $G(V, E, W)$ 中, 有向边 $(j, k)$ 的权重 $W(j, k) = A_{j,k}$ 。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

- $A$ 有两种图表示:  $n$ 个点的有向图, 和 $2n$ 个点的偶图。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}$   
有向图 $G(V, E, W)$ 中, 有向边 $(j, k)$ 的权重 $W(j, k) = A_{j,k}$ 。
- $\text{Permanent}(A)$ 是 $G$ 的所有圈覆盖权重之和。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

- $A$ 有两种图表示:  $n$ 个点的有向图, 和 $2n$ 个点的偶图。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}$   
有向图 $G(V, E, W)$ 中, 有向边 $(j, k)$ 的权重 $W(j, k) = A_{j,k}$ 。
- $\text{Permanent}(A)$ 是 $G$ 的所有圈覆盖权重之和。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}, U = \{1', 2', \dots, n'\}$ 。  
无向偶图 $H(V, U, E, W)$ 中, 边 $(j, k')$ 的权重 $W(j, k') = A_{j,k'}$ 。

# Permanent: 偶图的带权完美匹配数目

- $A$ 是 $n \times n$ 矩阵。

定义

$$\text{Permanent}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{j=1}^n A_{j,\pi(j)}$$

- $A$ 有两种图表示:  $n$ 个点的有向图, 和 $2n$ 个点的偶图。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}$   
有向图 $G(V, E, W)$ 中, 有向边 $(j, k)$ 的权重 $W(j, k) = A_{j,k}$ 。
- $\text{Permanent}(A)$ 是 $G$ 的所有圈覆盖权重之和。
- $V = \{1, 2, \dots, n\}, U = \{1', 2', \dots, n'\}$ 。  
无向偶图 $H(V, U, E, W)$ 中, 边 $(j, k')$ 的权重 $W(j, k') = A_{j,k'}$ 。
- $\text{Permanent}(A)$ 是 $H$ 的所有完美匹配权重之和。

# 计数版本与判定版本

- #SAT是#P难的，其判定版本SAT是NP难的。
- 偶图的完美匹配数目问题是#P难的，其判定版本偶图是否存在完美匹配，是有多项式时间算法的。  
用图的最大匹配算法即可。
- #2SAT是#P难的，其判定版本2SAT有多项式时间算法。

## 难和容易之间的问题

- 如果  $P \neq NP$ , 存在  $NP$  中的问题, 它不在  $P$  中, 也不是  $NP$  难的。 (非此即彼不成立)
- 证明是采用延迟对角线方法的构造性证明。
- 即一个人造的问题例子。

## 难和容易之间的问题

- 如果P不等于NP，存在NP中的问题，它不在P中，也不是NP难的。（非此即彼不成立）
- 证明是采用延迟对角线方法的构造性证明。
- 即一个人造的问题例子。

复杂性二分定理：一定范围内的问题要么难，要么容易

- 绝大多数研究过的NP中的问题，或者是NP难的，或者在P里。
- 一个问题集合中的问题要么是容易的（P），要么是难的（NP难），这种结果称为复杂性二分定理。
- 一种常见的问题集合，CSP（约束满足）问题。

# Dichotomy theorem of CSP

$\mathcal{F}$  is a set of relations in Boolean variables.

Theorem (Schaefer, STOC 1978)

Given a constraint set  $\mathcal{F}$ , the problem  $CSP(\mathcal{F})$  is in P, if  $\mathcal{F}$  satisfies one of the conditions below, and  $CSP(\mathcal{F})$  is otherwise NP-complete.

- $\mathcal{F}$  is 0-valid (1-valid).
- $\mathcal{F}$  is weakly positive (weakly negative). (Horn SAT)
- $\mathcal{F}$  is affine. (A system of linear equations)
- $\mathcal{F}$  is bijunctive. (2SAT)

## #CSP问题类

每一个#CSP问题的实例（输入）和答案（输出）形式是一样的。

- 实例：

作用于变量集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一些约束：

$$R_1(x_{1,1}, \dots, x_{1,r_1}), \dots, R_1(x_{m,1}, \dots, x_{m,r_m})$$

## #CSP问题类

每一个#CSP问题的实例（输入）和答案（输出）形式是一样的。

- 实例：

作用于变量集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一些约束：

$$R_1(x_{1,1}, \dots, x_{1,r_1}), \dots, R_1(x_{m,1}, \dots, x_{m,r_m})$$

- 答案：

$$\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$$

( $D$ 表示一个变量的定义域。)

## #CSP问题类

每一个#CSP问题的实例（输入）和答案（输出）形式是一样的。

- 实例：

作用于变量集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一些约束：

$$R_1(x_{1,1}, \dots, x_{1,r_1}), \dots, R_1(x_{m,1}, \dots, x_{m,r_m})$$

- 答案：

$$\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$$

( $D$ 表示一个变量的定义域。)

给定一个函数集合 $\mathcal{F}$ ，就定义了一个#CSP问题 $\#CSP(\mathcal{F})$ ，它的实例所用的约束 $R$ 必须来自 $\mathcal{F}$ 。

## #CSP问题类

每一个#CSP问题的实例（输入）和答案（输出）形式是一样的。

- 实例：

作用于变量集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的一些约束：

$$R_1(x_{1,1}, \dots, x_{1,r_1}), \dots, R_1(x_{m,1}, \dots, x_{m,r_m})$$

- 答案：

$$\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$$

( $D$ 表示一个变量的定义域。)

给定一个函数集合 $\mathcal{F}$ ，就定义了一个#CSP问题 $\#CSP(\mathcal{F})$ ，它的实例所用的约束 $R$ 必须来自 $\mathcal{F}$ 。

$\#2SAT = \#CSP(\{F | F(y, z) = y \vee z \text{ 或者 } \bar{y} \vee z \text{ 或者 } y \vee \bar{z} \text{ 或者 } \bar{y} \vee \bar{z}\})$

# #CSP的二分定理

布尔定义域的#CSP问题

- $\{0, 1\}$ 值域

只有一类问题有多项式时间算法，其他都是#P难的。

一类：仿射关系。

# #CSP的二分定理

## 布尔定义域的#CSP问题

- $\{0, 1\}$ 值域

只有一类问题有多项式时间算法，其他都是#P难的。  
一类：仿射关系。

- 非负实数值域

两类：pure affine和product type

# #CSP的二分定理

## 布尔定义域的#CSP问题

- $\{0, 1\}$ 值域

只有一类问题有多项式时间算法，其他都是#P难的。  
一类：仿射关系。

- 非负实数值域

两类：pure affine和product type

- 复数值域

两类： $\mathcal{A}$  和  $\mathcal{P}$ (即product type)

# 第一易解类： $\mathcal{A}$

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域  $D$  无需结构。）

# 第一易解类： $\mathcal{A}$

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域 $D$ 无需结构。）
- 定义仿射关系函数： $\chi_{(AX=C)}$ ，即 $D$ 上 $n$ 维空间的仿射子空间的指示函数。（ $D$ 作为大小2的有限域。）

# 第一易解类： $\mathcal{A}$

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域  $D$  无需结构。）
- 定义仿射关系函数： $\chi_{(AX=C)}$ ，即  $D$  上  $n$  维空间的仿射子空间的指示函数。（ $D$  作为大小 2 的有限域。）
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是一个整系数多项式， $x_j \in \{0, 1\}$ ，使用整数加法乘法运算。 $x_j^2 = x_j$ 。

# 第一易解类：A

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域  $D$  无需结构。）
- 定义仿射关系函数： $\chi_{(AX=C)}$ ，即  $D$  上  $n$  维空间的仿射子空间的指示函数。（ $D$  作为大小 2 的有限域。）
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是一个整系数多项式， $x_j \in \{0, 1\}$ ，使用整数加法乘法运算。 $x_j^2 = x_j$ 。
- 要求  $P$  的最高次数是 2；要求交错二次项的系数是偶数。

# 第一易解类： $\mathcal{A}$

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域  $D$  无需结构。）
- 定义仿射关系函数： $\chi_{(AX=C)}$ ，即  $D$  上  $n$  维空间的仿射子空间的指示函数。（ $D$  作为大小 2 的有限域。）
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是一个整系数多项式， $x_j \in \{0, 1\}$ ，使用整数加法乘法运算。 $x_j^2 = x_j$ 。
- 要求  $P$  的最高次数是 2；要求交错二次项的系数是偶数。
- 例如： $3x_1 + 2x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 。

# 第一易解类： $\mathcal{A}$

- $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。  $x_j \in D$ 。  $|D| = 2$ 。（定义计数问题时，定义域  $D$  无需结构。）
- 定义仿射关系函数： $\chi_{(AX=C)}$ ，即  $D$  上  $n$  维空间的仿射子空间的指示函数。（ $D$  作为大小 2 的有限域。）
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  是一个整系数多项式， $x_j \in \{0, 1\}$ ，使用整数加法乘法运算。 $x_j^2 = x_j$ 。
- 要求  $P$  的最高次数是 2；要求交错二次项的系数是偶数。
- 例如： $3x_1 + 2x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 。
- $F \in \mathcal{A}$ ，当且仅当有形式  $\chi_{(AX=C)} \cdot i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$ 。

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法



$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法



$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。



$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,r} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r, L_{r+1}(X'), \dots, L_n(X'))}$$

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,r} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r, L_{r+1}(X'), \dots, L_n(X'))}$$

- $P$  采用整数运算, 作为  $i$  的指数, 可以模4运算。

## #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,r} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r, L_{r+1}(X'), \dots, L_n(X'))}$$

- $P$  采用整数运算, 作为  $i$  的指数, 可以模4运算。
- 下面把解表达式的模2运算融入模4运算。

# #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。
- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,r} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r, L_{r+1}(X'), \dots, L_n(X'))}$$

- $P$  采用整数运算, 作为  $i$  的指数, 可以模4运算。
- 下面把解表达式的模2运算融入模4运算。
  - 如果  $P$  里有一个一次项  $x_3$ , 换成  $L_3(X')^2$ 。 (因为  $L^2 \pmod{4}$  等于  $L \pmod{2}$ 。)

# #CSP( $\mathcal{A}$ )的算法

- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,n} \chi_{(AX=C)} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

- 假设  $AX = C$  的自由变量是  $x_1, \dots, x_r$ ,  
解是  $x_{r+1} = L_{r+1}(X')$ , ...  $x_n = L_n(X')$ 。  $X' = \{x_1, \dots, x_r, 1\}$ 。
- 例如, 方程组是  $x_3 = x_1 + x_2 + 1 \pmod{2}$ 。
- 

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}, j=1,\dots,r} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r, L_{r+1}(X'), \dots, L_n(X'))}$$

- $P$  采用整数运算, 作为  $i$  的指数, 可以模4运算。
- 下面把解表达式的模2运算融入模4运算。
  - 如果  $P$  里有一个一次项  $x_3$ , 换成  $L_3(X')^2$ 。 (因为  $L^2 \pmod{4}$  等于  $L \pmod{2}$ 。)
  - 如果有  $2x_3x_4$ , 因为  $2x_3x_4 \pmod{4} = 2(x_3 \pmod{2})(x_4 \pmod{2})$ , 代入  $L_3, L_4$  即可。

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r)}$$

- 无 $x_1$ 项，或者 $x_1$ 一次项系数是2。提取所有的 $2x_1$ 公因子。

$$\begin{aligned} \sum_{x_2, \dots, x_r} \sum_{x_1} i^{2x_1 L(X) + P'(x_2, \dots, x_r)} &= \sum_{x_2, \dots, x_r} \left( i^{P'(x_2, \dots, x_r)} \sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)} \right) \\ \sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)} &= 2\chi_{(L(X)=0)} \end{aligned}$$

$$\sum_{x_j \in \{0,1\}} i^{P(x_1, x_2, \dots, x_r)}$$

- 无  $x_1$  项，或者  $x_1$  一次项系数是 2。提取所有的  $2x_1$  公因子。

$$\begin{aligned} \sum_{x_2, \dots, x_r} \sum_{x_1} i^{2x_1 L(X) + P'(x_2, \dots, x_r)} &= \sum_{x_2, \dots, x_r} (i^{P'(x_2, \dots, x_r)} \sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)}) \\ \sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)} &= 2\chi_{(L(X)=0)} \end{aligned}$$

- 有  $x_1$  项（系数是 1 或者 3，以 3 为例）。提取  $2x_1$ ， $x_1$  的一次项不动。

$$= \sum_{x_2, \dots, x_r} (i^{P'(x_2, \dots, x_r)} \sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)} i^{3x_1})$$

当  $L(X) \equiv 0 \pmod{2}$  时， $F(1, x_2, \dots, x_r) = -iF(0, x_2, \dots, x_r)$ ；

当  $L(X) \equiv 1 \pmod{2}$  时， $F(1, x_2, \dots, x_r) = iF(0, x_2, \dots, x_r)$ 。

$$\sum_{x_1} (-1)^{x_1 L(X)} i^{3x_1} = (1 - i)i^{L^2(X)}$$

原本是关于  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的  $2^n$  个赋值对  $\chi \cdot i^P$  求和，已经看到了如何消除  $\chi$  中的非自由变量和  $i^P$  中的一个变量，代价是函数表达式  $\chi \cdot i^P$  的幅度受控的变化。

消除一个变量  $x_i$ ，即从对两个大小  $2^{n-1}$  的超平面的点的函数值求和，转化成对其中一个超平面的点的函数值求和。




Figure: 虚线右侧区域表示仿射子空间  $L(X) = 1$

第一种情况， $C = 1$ 。第二种情况， $C = \pm i$ 。

## A中的二元函数例子

- 

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- $\#\text{CSP}(F)$ 问题的一个实例，是一些 $F$ 应用到变量 $x_1, \dots, x_n$ 。
- 这个实例对应图 $G$ ,  $V_G = \{x_1, \dots, x_n\}$ ,  $(j, k) \in E_G$ 当且仅当实例中有约束 $F(x_j, x_k)$ 。
- 考虑被赋值1的顶点形成的子图 $H$ 。如果 $H$ 有奇（偶）数条边，所有约束的乘积是 $-1$ （ $1$ ）。
- $\#\text{CSP}(F)(G) =$ 图 $G$ 的偶数条边的这种子图数目 - 奇数条边的子图数目。
- 图 $G$ 的偶数条边的子图数目是多项式时间可以计算的。

## 第二易解类: product type

- 一个 $n$ 元函数 $F$ 在集合 $\mathcal{E}$ , 当且仅当它在除某互补串对 $\alpha$ 和 $\bar{\alpha}$ 之外的输入上值都是0。

严格定义:  $F \in \mathcal{E}$ 当且仅当存在 $\alpha \in \{0, 1\}^n$ ,  
 $\forall X, X \notin \{\alpha, \bar{\alpha}\} \Rightarrow F(X) = 0$ 。

## 第二易解类：product type


- 一个 $n$ 元函数 $F$ 在集合 $\mathcal{E}$ , 当且仅当它在除某互补串对 $\alpha$ 和 $\bar{\alpha}$ 之外的输入上值都是0。

严格定义： $F \in \mathcal{E}$ 当且仅当存在 $\alpha \in \{0, 1\}^n$ ,  
 $\forall X, X \notin \{\alpha, \bar{\alpha}\} \Rightarrow F(X) = 0$ 。

- 一个变量赋值若要对和 $\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$ 有非0贡献, 它对 $\mathcal{E}$ 中函数 $F$ 的一个变量的赋值, 决定了它对其他 $F$ 的变量的唯一赋值。


## 第二易解类: product type

- 一个 $n$ 元函数 $F$ 在集合 $\mathcal{E}$ , 当且仅当它在除某互补串对 $\alpha$ 和 $\bar{\alpha}$ 之外的输入上值都是0。  
严格定义:  $F \in \mathcal{E}$ 当且仅当存在 $\alpha \in \{0, 1\}^n$ ,  
 $\forall X, X \notin \{\alpha, \bar{\alpha}\} \Rightarrow F(X) = 0$ .
- 一个变量赋值若要对和 $\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$ 有非0贡献, 它对 $\mathcal{E}$ 中函数 $F$ 的一个变量的赋值, 决定了它对其他 $F$ 的变量的唯一赋值。
- #CSP问题的实例可以画成偶图。



## 第二易解类: product type


- 一个 $n$ 元函数 $F$ 在集合 $\mathcal{E}$ , 当且仅当它在除某互补串对 $\alpha$ 和 $\bar{\alpha}$ 之外的输入上值都是0。  
严格定义:  $F \in \mathcal{E}$ 当且仅当存在 $\alpha \in \{0, 1\}^n$ ,  
 $\forall X, X \notin \{\alpha, \bar{\alpha}\} \Rightarrow F(X) = 0$ .
- 一个变量赋值若要对和 $\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$ 有非0贡献, 它对 $\mathcal{E}$ 中函数 $F$ 的一个变量的赋值, 决定了它对其他 $F$ 的变量的唯一赋值。
- #CSP问题的实例可以画成偶图。



- 连通的 $\mathcal{E}$ 函数乘在一起, 还是 $\mathcal{E}$ 函数。

## 第二易解类: product type

- 一个 $n$ 元函数 $F$ 在集合 $\mathcal{E}$ , 当且仅当它在除某互补串对 $\alpha$ 和 $\bar{\alpha}$ 之外的输入上值都是0。  
严格定义:  $F \in \mathcal{E}$ 当且仅当存在 $\alpha \in \{0, 1\}^n$ ,  
 $\forall X, X \notin \{\alpha, \bar{\alpha}\} \Rightarrow F(X) = 0$ .
- 一个变量赋值若要对和 $\sum_{X \in D^n} \prod_{j=1}^m R_j$ 有非0贡献, 它对 $\mathcal{E}$ 中函数 $F$ 的一个变量的赋值, 决定了它对其他 $F$ 的变量的唯一赋值。
- #CSP问题的实例可以画成偶图。



- 连通的 $\mathcal{E}$ 函数乘在一起, 还是 $\mathcal{E}$ 函数。
- 一个函数是product type当且仅当能表示成 $\mathcal{E}$ 中函数的乘积。



## 参考文献

- Nadia Creignou, Miki Hermann:  
Complexity of Generalized Satisfiability Counting Problems. Inf. Comput. 125(1): 1-12 (1996)
- Martin E. Dyer, Leslie Ann Goldberg, Mark Jerrum:  
The Complexity of Weighted Boolean CSP. SIAM J. Comput. 38(5): 1970-1986 (2009)
- Jin-Yi Cai, Pinyan Lu, Mingji Xia:  
The complexity of complex weighted Boolean #CSP. J. Comput. Syst. Sci. 80(1): 217-236 (2014)
- 以上布尔定义域的#CSP问题复杂性，此外还有counting graph homomorphism, Holant等计数问题。  
关于这些问题的复杂性二分定理综合综述，蔡进一和陈汐的书草稿。
- Complexity Classifications of Boolean Constraint Satisfaction Problems, 2001  
Nadia Creignou, Sanjeev Khanna, Madhu Sudan  
包含了早期的判定问题、计数问题和优化问题的复杂性二分